

Treurmaina

Acridotheres tristis

MARTIN TRISTE | COMMON MYNA

Synoniemen: Indische maina, Herdermaina of Treurspreeuw

Introductie | Ontsnappingen uit gevangenschap (dierentuin, huisdier).

Verspreiding in België | Losse waarnemingen van ontsnapte vogels, soms broedpogingen in de natuur.

Problematiek | Competitie met en predatie van (eieren en jongen van) inheemse vogels en ongewervelden. In grote groepen kunnen ze schade aanrichten aan de fruitteelt en overlast veroorzaken. Vector van parasieten en ziektes zoals vogelgriep.

Gelijkende soorten | In de handel kan de soort verward worden met andere Maina soorten zoals *A. cristatellus*, *A. javanicus*, *A. grandis*, *A. fuscus* en *A. cinereus*, alsook met populaire kooivogels uit het geslacht *Gracula* (beo) zoals *G. religiosa* en *G. ptilogenys*.

MEER INFO

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/2994>

<https://waarnemingen.be/soort/info/2268>



KENMERKEN

Bruine vogel van medium grootte

- Grootte: 23-26 cm; gewicht: 88-143 g; spanwijdte: 23-26 cm
- Verenkled: borst, nek en kop glazend zwart; rest van het lichaam cacao-bruin; onderkant staart, staarttip en enkele veren zijn wit. In vlucht: witte vlek aan uiteinde vleugel, en onderkant vleugel wit
- Snavel, poten en zone rond de ogen is felgeel. De naakte, gele zone rond de ogen is kenmerkend voor de soort
- Iris: grijs bij juvenielen; grijsbruin tot rood met witte vlekken bij volwassenen
- In het veld verplaatst de vogel zich al wandelend (i.p.v. springend)

