

Nieuw-Zeelandse platworm

Arthurdendyus triangulatus

VER PLAT DE NOUVELLE-ZÉLANDE | NEW ZEALAND FLATWORM

Introductie | Als contaminant van aarde van ornamentele planten in pot en van kweeksubstraat.

Verspreiding in België | Afwezig.

Problematiek | Predator die de diversiteit en biomassa van aardwormen vermindert. Dit kan een sterke degradatie van de kwaliteit en structuur van de bodem veroorzaken, wat de opbrengsten van cultuurgewassen verlaagt.

Gelijkende soorten | *A. triangulatus* kan verward worden met andere platwormen zoals die van het genus *Microplana*, *Bipalium* of *Platydemus* maar deze zijn minder groot. Ook terrestrische bloedzuigers zouden verwarring kunnen veroorzaken, maar deze zijn gesegmenteerd.

MEER INFO

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/109121>

<https://waarnemingen.be/species/800121>



KENMERKEN

Afgeplatte, plakkerige, terrestrische worm met een beige rand

- Grootte: tot 200 mm lang en 10 mm breed (volledig uitgerokken); wordt smaller naar voren toe
- Lichaam: niet geled, slechts 1 lichaamsopening in het midden van de onderkant
- Kleur: leverbruin met een bleke, beige rand ① en onderkant ②. Deze bleke delen zijn doorvlekt met grijs; naar de voorkant toe krijgt de worm een rose tint, met zwarte oogvlekjes aan weerskanten van de kop
- Eicapsule: eivormig; 4-8 mm doorsnede; glanzend zwart
- Veelal opgerold

