

Amerikaanse stierkikker

Lithobates (Rana) catesbeianus

GRENOUILLE TAUREAU | AMERICAN BULLFROG

Synoniem: Brulkikker

Introductie | Uitzettingen in vijvers en de natuur. Larven kunnen in het water meeliften met vis voor bepoting.

Verspreiding in België | Grote populatie in de vallei van de Grote Nete, verder nog enkele kleinere populaties ten noorden van de vallei van de Samber en de Maas.

Problematiek | Zeer competitieve en vraatzuchtige soort. Vormt een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit in het algemeen en amfibieën in het bijzonder. Drager van verschillende amfibieënziektes.

Gelijkende soorten | In het veld kan de soort verward worden met grote exemplaren van de inheemse kikkers zoals de meerkikker *Pelophylax esculentus* en de bastaardkikker *Pelophylax ridibundus* (dorsolaterale lijsten aanwezig). Er zijn nog grote padden die soms in gevangenschap worden gehouden, maar deze zijn meestal wrattig in plaats van glad. Voor de identificatie van larven raadpleeg je best een expert.

MEER INFO

<https://waarnemingen.be/species/1724>



KENMERKEN

Zeer grote soort

- Grootte: tot 25 cm; gewicht: tot 500 g
- Tekening: groene tot bruine rug en kop met donkerdere aftekening; geen centrale streep op de rug; witte buik met grijze marmervlekken; mannetjes hebben een gele keel
- Zeer groot trommelvlies ①, minstens even groot als het oog
- Gladde rug zonder dorsolaterale lijsten
- Vrij ronde neus
- Paringsroep klinkt al een loeiende koe (lente)
- Larven tot 17 cm groot met fijne, duidelijk afgelijnde, zwarte puntjes ② (van gelijke grootte) op de rug en de bovenste staartstraal

