

Berces

Trois espèces de berces exotiques sont actuellement reprises sur la liste européenne. Elles sont présentées ici de manière regroupée en raison des similarités de leurs caractéristiques, leurs nuisances, leurs voies d'introduction, etc.

Voies d'introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales (jardins privés, jardins botaniques, etc.). Contamination accidentelle avec le transport de terre.

Nuisances | Forment des populations très denses et concurrencent la végétation indigène. La sève peut causer des sévères brûlures de la peau au contact des rayons du soleil.

Espèces ressemblantes | Ces trois espèces peuvent être confondues entre elles et avec d'autres espèces du genre *Heracleum*. Les jeunes plants peuvent être confondus avec des espèces d'ombellifères indigènes, en ce compris la berce commune (*Heracleum sphondylium*).



Berce du Caucase

Heracleum mantegazzianum

REUZENBERENKLAUW | GIANT HOGWEED

Synonyme: Berce de Mantegazzi

Distribution en Belgique | Très répandue sur tout le territoire.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille: 2-3 m de haut, voire plus
- Tige: jusqu'à 10 cm de diamètre, cannelée, creuse, couverte de poils et de taches rougeâtres ①
- Feuilles: très grandes, alternes, dentées et profondément découpées ②; le pétiole et le dessous des feuilles sont poilus
- Fleurs: fleurs blanches, disposées en grandes ombelles > 30 cm comprenant de 50 à 150 rayons; floraison en juin-juillet
- Graines: jaune paille, ovales, de 6-18 mm de long, marquées de 3-5 sillons rouges



RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33494>