

Siberische grondeekhoorn

(Eu)*Tamias sibiricus*

TAMIA DE SIBÉRIE | SIBERIAN CHIPMUNK

Synoniemen: Koreaanse of Aziatische gestreepte grondeekhoorn, Boeroendoek

Invoerwijze | Ontsnappingen uit gevangenschap.

Distributie | Grote populatie in het Zoniënwoud, daarbuiten enkel geïsoleerde waarnemingen.

Problematiek | Mogelijke impact op biodiversiteit. Belangrijk reservoir voor de ziekte van Lyme.

Gelijkende soorten | In de handel kan de Siberische grondeekhoorn verward worden met verschillende andere soorten zoals *Tamias striatus*, *Funambulus pennantii*, *Menetes berdmorei*, *Tamiops mccllellandii*, *Callospermophilus lateralis*.

MEER INFO

<https://waarnemingen.be/species/1819>



KENMERKEN

- Grootte: kleine eekhoorn: kop-staart: 18-25 cm; staart: 8-12 cm; gewicht: 70-125 g
- Vacht:
 - overwegend bruin in verschillende tinten met grijze accenten; witte keel en buik
 - 4 lichte en 5 donkere lengtestrepen op de rug en zijde: de drie donkere rugstrepen zijn langer dan de twee donkere op de flanken; het centrale paar lichte strepen is zandgrijs tot fel rood; het laterale paar lichte strepen is as-grijs tot oker en zelfs okerrood; 2 donkere strepen aan weerszijden van de kop
- Kop: puntige snuit met wangzakken om voedsel te hamsteren; kleine afgeronde oren zonder oorpluimen



Deze soort kan makkelijk verward worden met andere Tamias soorten, het is daarom aan te raden en expert te contacteren.