

Écureuil de Pallas

Callosciurus erythraeus

PALLAS EEKHOORN | PALLAS'S SQUIRREL

Synonyme : Écureuil à ventre rouge

Voies d'introduction | Échappé de captivité.

Distribution en Belgique | Absent (éradiqué en Flandre mais observations isolées dans le nord de la Campine).

Nuisances | Menace potentielle pour l'écureuil roux. Dégâts économiques aux arbres et aux plantations. Porteur de pathogènes transmissibles à l'homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d'autres espèces du même genre, qui sont aussi commercialisées, telles que *C. carolinensis*, *C. Caniceps*, *C. pygerytrus*, *C. prevostii*, *C. finlaysonii*, *Sundasciurus hippurus*, *Heliosciurus rufobrachium* et également d'autres espèces telles que *Sciurus lis* and *Sciurus niger*. L'espèce peut également être confondue avec l'écureuil indigène: l'écureuil roux (*Sciurus vulgaris*).

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33359>



CARACTÉRISTIQUES

- Taille: tête et corps: 20-26 cm; queue: 16-20 cm; poids: 210-435 g
- Pelage: couleur variable, ventre rouge-orangé (avec ou sans rayures) et dos brun-olive; pattes grises; queue légèrement annelée et parfois grise au bout
- Pas de pinceaux sur les oreilles



Cette espèce est très variable, il est recommandé de contacter un expert pour valider son identification.