

Grenouille taureau

Lithobates (Rana) catesbeianus

AMERIKAANSE STIERKIKKER | AMERICAN BULLFROG

Synonyme : Grenouille mugissante

Voies d'introduction | Relâchée dans les étangs ou dans la nature. Les larves peuvent être accidentellement présentes dans des lots de réempoissonnement.

Distribution en Belgique | Une large population dans la vallée de la Grote Nete, plusieurs petites populations isolées au nord du sillon Sambre et Meuse.

Nuisances | Espèce très compétitive et vorace, elle représente une menace pour de nombreuses espèces animales aquatiques. Cette espèce est porteuse de maladies spécifiques aux amphibiens.

Espèces ressemblantes | Dans l'environnement, cette espèce peut être confondue avec *Pelophylax esculentus* ou *Pelophylax ridibundus* (individus de grande taille). Des espèces de crapauds de grande taille sont commercialisées, mais la présence de pustules sur leur dos les distingue de la grenouille taureau.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33354>



CARACTÉRISTIQUES

Grenouille de très grande taille

- Taille: jusqu'à 25 cm; poids: jusqu'à 500 g
- Coloration: tête et dos vert à brun avec des marques plus foncées, absence de ligne dorsale, face ventrale blanche avec des traces grises. Chez le mâle, la gorge est jaune
- Très grand tympanan ①, au moins aussi grand que l'oeil
- Dos lisse, sans plis dorso-latéraux
- Museau arrondi
- En été: chant nuptial rappelant le meuglement d'une vache
- Larves: jusqu'à 17 cm, avec des fins pointillés noirs sur la nageoire dorsale et sur le dos ②

