

Tamia de Sibérie

(Eu)*Tamias sibiricus*

SIBÉRISCHE GRONDEEKHOORN | SIBERIAN CHIPMUNK

Synonymes: Écureuil de Corée, Rat de Corée, Écureuil japonais

Voies d'introduction | Échappé de captivité.

Distribution en Belgique | Large population en forêt de Soignes et observations isolées ailleurs.

Nuisances | Impact potentiel sur la biodiversité mais peu documenté. Réservoir important pour la maladie de Lyme.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être confondue avec plusieurs espèces, comme *Tamias striatus*, *Funambulus pennantii*, *Menetes berdmorei*, *Tamiops mcclendai*, *Callospermophilus lateralis*.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33359>



CARACTÉRISTIQUES

- Taille: petit écureuil: de la tête au bout de la queue: 18-25 cm; queue: 8-12 cm; poids: 70-125 gr
- Pelage: fourrure brun clair avec des reflets gris, gorge et ventre blancs
- Dos: 5 rayures longitudinales foncées et 4 rayures longitudinales claires sur le dos; les 3 rayures longitudinales foncées sur le dos sont plus longues que les 2 rayures longitudinales sur les flancs; les 2 rayures centrales claires sont de couleur gris-sable à rouge vif et les 2 rayures claires sur les flancs sont beiges à ocre-rouge
- Tête: 2 rayures foncées sur les côtés de la tête; museau pointu; abajoues; petites oreilles sans pinceaux



Cette espèce peut être facilement confondue avec d'autres espèces de *Tamias*, il est recommandé de contacter un expert pour valider son identification.