

Chinese struikklover

Lespedeza cuneata

LESPÉDÉZA SOYEUX | CHINESE BUSHCLOVER

Introductie | Aangeplant als sierplant en vervolgens verspreid in natuurlijk milieu. Contaminant van hooitransporten.

Verspreiding in België | Afwezig

Problematiek | Verlaagt de lichtbeschikbaarheid. Grote competitor voor water die een aantoonbare impact heeft op de inheemse fauna en flora.

MEER INFO

<https://www.cabi.org/isc/abstract/20143244935>



KENMERKEN

- Stengels: één of meer zeer dunne stengels; grijsgroen; behaard (haren in rijen ingeplant)
- Blad: alternerend ingeplant op de stengel, samengesteld uit drie afzonderlijke lobben: elke lob is 1,3-2,5 cm lang, behaard en heeft een afgeronde top met een kleine punt
- Bloem: wit met paarse vegen op bovenste bloemblad; bilateraal symmetrisch; in trossen van 2 of 4; bloei: juli-september
- Zaad: ronde tot ovale, afgeplatte zaaddoos; 3-4 mm; 1 zaad per zaaddoos; zaaddozen langs de hele stengel ingeplant of gegroepeerd aan de top van de stengel; omgeven door groene blaadjes

