

# Ongelijkbladig vederkruid

*Myriophyllum heterophyllum*

MYRIOPHYLLE HÉTÉROPHYLLE | BROADLEAF WATERMILFOIL

**Introductie** | Verspreiding vanuit (sier)vijvers of aquaria, waar ze oorspronkelijk als zuurstofplant geïntroduceerd werden. Onbedoeld transport via boten, visuitrusting, of slibverzet en de gebruikte machinerie. Natuurlijke verspreiding vanuit de buurlanden.

**Verspreiding in België** | Geïsoleerde populaties in Vlaanderen (provincie Antwerpen) en Wallonië.

**Gelijkende soorten** | In het veld kan de soort verward worden met inheemse soorten zoals vederkruidsoorten (*Myriophyllum verticillatum*, *M. spicatum*, *M. alterniflorum*) - waarbij de ondergedoken vormen de hulp van een expert vereisen voor correcte identificatie-, lidsteng (*Hippuris vulgaris*) en de waterviolier (*Hottonia palustris*). In de handel en in het veld kan de soort kan verward worden met hoornbladsoorten (*Ceratophyllum* spp.) en *Myriophyllum tetrandum*, *M. tuberculatum*, *M. brasiliense*, *M. simulans* and *M. spicatum* (inheems).

## MEER INFO

<https://waarnemingen.be/species/17153>



## KENMERKEN

In het natuurlijk milieu is de plant volledig ondergedoken in de lente en vormt opstaande stengels in de zomer en de herfst.

- Stengel: groen, tot 3 meter lang, kunnen 5-15 cm boven het wateroppervlak uitsteken
- Blad:
  - Ondergedoken ① : 2-5 cm ; groen, fijn verdeelde veernervige bladeren onder water. In kransen van 5 (soms 4 of 6) rond de stengel ingeplant
  - Boven water ② : ongedeeld, getande bladeren ; klein : 0,5-3 cm
- Bloem: onopvallende kleine, felroze bloem in bladoksel van de getande bladeren; bloei: juni-juli

