

Écureuil fauve

Sciurus niger

AMERIKAANSE VOSEEKHOORN | FOX SQUIRREL

Voies d'introduction | Échappé de captivité.

Distribution en Belgique | Observations sporadiques dans des espaces verts, pas de populations établies.

Nuisances | Menace potentielle pour l'écureuil roux. Dégâts aux arbres et aux plantations. Porteur de pathogènes transmissibles à l'homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce pourrait être confondue avec d'autres espèces d'écureuils exotiques qui sont commercialisées : l'écureuil de Pallas (*Callosciurus erythraeus*), l'écureuils gris (*Sciurus carolinensis*), l'écureuil arboricole de Prévost (*Callosciurus prevostii*), l'écureuil de Fynlaison (*Callosciurus finlaysonii*) ou l'écureuil du Japon (*Sciurus lis*). L'écureuil de Pallas et l'écureuils gris sont deux espèces également présentes sur la liste européenne. L'espèce peut également être confondue avec l'écureuil indigène : l'écureuil roux (*Sciurus vulgaris*).

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33359>



CARACTÉRISTIQUES

- Taille: gabarit imposant, tête-queue: 45-70 cm; queue: 20-33 cm; poids: 0,5-1,3 kg
- Pelage: gris teinté d'orange, très variable, ventre souvent orangé, queue grise et orangée en-dessous; il existe une forme noire
- Pas de pinceaux sur les oreilles



Cette espèce est très variable, il est recommandé de contacter un expert pour valider son identification.