

# Berces

Trois espèces de berces exotiques sont actuellement reprises sur la liste européenne. Elles sont présentées ici de manière regroupée en raison des similarités de leurs caractéristiques, leurs nuisances, leurs voies d'introduction, etc.

**Voies d'introduction** | Dispersion depuis des plantations ornementales (jardins privés, jardins botaniques, etc.). Contamination accidentelle avec le transport de terre.

**Nuisances** | Forment des populations très denses et concurrencent la végétation indigène. La sève peut causer des sévères brûlures de la peau au contact des rayons du soleil.

**Espèces ressemblantes** | Ces trois espèces peuvent être confondues entre elles et avec d'autres espèces du genre *Heracleum*. Les jeunes plants peuvent être confondus avec des espèces d'ombellifères indigènes, en ce compris la berce commune (*Heracleum sphondylium*).



# Berce de Sosnowsky

*Heracleum sosnowskyi*

SOSNOWSKY'S BERENKLAUW | SOSNOWSKYI'S HOGWEED

**Distribution en Belgique** | Absent.

## CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur de la plante: jusqu'à 3 m
- Tige: cannelée, poilue, avec des taches pourpres
- Feuille: très découpée, bord avec des dents courtes et arrondies. Le dessous de la feuille est poilu
  - 2 formes:
    - 3 lobes de taille similaire, qui peuvent être aussi découpés en trois lobes chacun
    - plus de 3 petites feuilles insérées les unes au-dessus des autres
- Fleurs: blanches, parfois roses, disposées en ombelles concaves (léger) de 30-50 cm de diamètre; les ombelles ont 30-75 rayons chacune; floraison de juin à août
- Graine: couleur jaune clair, ovale, 8-15 mm de long, marquée de sillons bruns



## RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<https://www.cabi.org/ISC/datasheet/108958>