

Asclépiade de Syrie

Asclepias syriaca

ZIJDEPLANT | COMMON MILKWEED

Synonymes: Asclépiade commune, Herbe-à-la-ouate

Voies d'introduction | Dispersion dans l'environnement depuis des plantations ornementales.

Distribution en Belgique | Rare, quelques populations isolées.

Nuisances | Concurrence la végétation indigène. Plante toxique pour le bétail.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d'autres espèces d'asclépiades (*Asclepias spp.*) et avec le chanvre du Canada (*Apocynum cannabinum*).

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/7249>



CARACTÉRISTIQUES

- Tige: jusqu'à 2 m de hauteur, poils courts et sève blanche
- Feuilles: 10-20 cm de long, larges, ovales et dressées vers le haut. Face inférieure blanchâtre. Court pétiole et insertion opposée sur la tige (disposition en croix)
- Fleurs: blanches à roses, odorantes. Inflorescence en boule portée par un court pédicelle partant de l'aisselle des feuilles; floraison en juillet-août
- Graines: brunes, ovales et aplaties terminées par une aigrette de soies blanches ①; regroupées dans des gousses blanchâtres caractéristiques de 7-10 cm de long ②, qui peuvent persister tout l'hiver