

# Myriophylle du Brésil

*Myriophyllum aquaticum*

PARELVEDERKRUID | PARROT'S FEATHER

Synonyme: Myriophylle aquatique

**Voies d'introduction** | Dispersion depuis des plans d'eau, des bassins de jardins ou relâché d'aquarium. Transport involontaire sur des équipements de pêche ou par des embarcations.

**Distribution en Belgique** | Largement répandu dans tout le pays, mais plus fréquent en Flandre.

**Espèces ressemblantes** | Dans l'environnement, la plante immergée peut être confondue avec des espèces indigènes de Myriophylles: *Myriophyllum spicatum*, *M. alterniflorum* et *M. verticillatum*. La plante entière peut être confondue avec la pesse d'eau (*Hippuris vulgaris*) et l'hottonie des marais (*Hottonia palustris*). Dans le commerce ou dans l'environnement, l'espèce est fréquemment confondue avec *Myriophyllum robustum*, commercialisé sous le nom de 'brasiliense'.

## RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=28299>



## CARACTÉRISTIQUES

Dans l'environnement, la plante est entièrement immergée au printemps et forme des tiges émergées en été et en automne.

- Tiges:
  - émergées: glabres et recouvertes d'une cire bleuâtre; peuvent atteindre 15-40 cm de haut
  - immergées: glabres et rougeâtres; jusqu'à 4 m de long
- Feuilles: très découpées (en forme de « plume »), insérées par 5 autour de la tige (parfois 4 ou 6)
- Fleurs: quasiment invisibles à l'œil nu, placées à la base de la feuille, de couleur blanche; floraison: juin-août

