

POISSONS

Poisson-chat commun

Ameiurus melas

Zwarte dwergmeerval × Black bullhead × Schwarzer Zwergwels
Synonymes : Barbotte noire

Origine

Côte Est de l'Amérique du Nord

Voies d'introduction

Introduit délibérément aux Pays-Bas comme une espèce de poisson robuste pouvant survivre dans l'Escaut. Dispersion naturelle depuis les pays voisins. Échappé de captivité (aquarium, aquaculture).

Usages en Belgique

Dans le passé, cette espèce était utilisée en aquaculture.

Distribution en Belgique

Probablement absent (mais présent en France et aux Pays-Bas).

Habitat potentiel en Belgique

Diversité d'habitats aquatiques d'eau douce. Préférence pour les eaux stagnantes ou à débit très lent. Tolère très bien les eaux polluées et pauvres en oxygène.

Nuisances

Concurrence la faune indigène de poissons par prédation et compétition. Peut atteindre des densités élevées dans les eaux stagnantes, et augmenter la turbidité. Porteur de plusieurs parasites et maladies des poissons.



© Pascale Golinvaux @ RBINS



© yehfishmeh, some rights reserved (CC BY-NC)



© Shutterstock

Caractéristiques

Poisson d'eau douce

- Taille : en moyenne 25-30 cm ; poids < 400g
- Coloration : dos de couleur variable vert-brun à jaunâtre, ventre jaune vif à blanc crème, côtés plus clairs, et nageoires foncées.
- Tête : grande et arrondie avec de petits yeux ; bouche, menton et narines munies de 8 barbillons ; barbillons autour de la bouche deux fois plus longs que ceux des narines, barbillons du menton noirs.
- Nageoires : deux nageoires dorsales courtes – l'antérieure contient une épine et la postérieure est adipeuse et sans rayons ; nageoire caudale à bord droit ou légèrement arrondi ; nageoire anale avec 17 à 24 rayons ; radiation noir et blanc présente sur les nageoires anale et caudale 1.

Espèces ressemblantes

Dans l'environnement, cette espèce peut être confondue avec la barbotte brune (*Ameiurus nebulosus*) qui se différencie cependant par la présence de barbes régulières en forme de scie sur le bord des épines pectorales, à l'absence de rayons noirs et blancs sur les nageoires anale et caudale, et par les taches présentes sur les flancs des grands spécimens.

Pour plus d'informations

GÉNÉRAL

→ <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.94466>

ESPÈCES RESSEMBLANTES

- Rutkayová, J., Biskup, R., Harant, R., Šlechta, V., & Koščo, J. (2013). *Ameiurus melas* (black bullhead): morphological characteristics of new introduced species and its comparison with *Ameiurus nebulosus* (brown bullhead). *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 23(1), 51-68. (ENG)
- Decru, E. & Snoeks, J. 2011. Vergelijkende morfologische studie van de geïntroduceerde zwarte Amerikaanse dwergmeerval *Ameiurus melas* en de bruine Amerikaanse dwergmeerval *A. nebulosus* in België en enkele buurlanden. Rapport voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.R.2011.40. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren: 36 pp. (NL)

SITES RÉGIONAUX

- Wallonie : <http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives>
- Flandre : <https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-dieren>

MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN BELGIQUE

→ <http://www.iasregulation.be/fr>

Restrictions

Sauf exceptions dûment prévues par le Règlement européen, cette espèce ne peut pas être importée, transportée, commercialisée, échangée, détenue, élevée, reproduite, ou libérée intentionnellement dans la nature au sein de toute l'Union européenne.