

Parelvederkruid

Myriophyllum aquaticum

MYRIOPHYLLE DU BRÉSIL | PARROT'S FEATHER

Introductie | Verspreiding vanuit (sier)vijvers of aquaria waar ze oorspronkelijk als zuurstofplant geïntroduceerd werden. Onbedoeld transport via boten, machinerie, visuitrusting, of grondverzet.

Verspreiding in België | Redelijk wijdverspreid in het hele land, maar komt meer frequent voor in Vlaanderen.

Gelijkende soorten | In het veld kan de soort verward worden met inheemse soorten zoals vederkruidsoorten (*M. verticillatum*, *M. spicatum*, *M. alterniflorum*) - waarbij de ondergedoken vormen de hulp van een expert vereisen voor correcte identificatie-, lidsteng (*Hippuris vulgaris*) en de waterviolier (*Hottonia palustris*). In de handel en in het veld kan de soort makkelijk verward worden met hoornbladsoorten (*Ceratophyllum spp.*) en *Myriophyllum* soorten (waarbij de soort veelal verward wordt met *M. robustum* – die gecommercialiseerd is onder de naam *M. brasiliensis*).

MEER INFO

<https://waarnemingen.be/species/7081>



KENMERKEN

In het natuurlijk milieu is de plant volledig ondergedoken in de lente en vormt opstaande stengels in de zomer en de herfst.

- Stengel:
 - Opstaande stengels: geen haartjes; met blauwe schijn; kunnen 15-40 cm boven het wateroppervlak uitsteken
 - Ondergedoken stengels: geen haartjes en roodachtig, tot 4 m lang
- Blad: diep ingesneden veernervige bladeren in kransen van 4-6 rond de stengel (meestal 5) ingeplant; geen haartjes op het blad
- Bloem: zeer onopvallende, kleine, witte bloem in bladoksel; bloei: juni-augustus

