

VISSSEN

Amerikaanse baars

Morone americana

Bar blanc d'Amérique × White perch × Amerikanischer Streifenbarsch



Herkomst

Noordoost-Amerika

Introductie

Contaminant van kweek van hybride morone; eventueel via ballastwater.

Gebruik in België

Geen gekend gebruik in België.

Verspreiding in België

Afwezig.

Habitat in België

Veelal brak water, maar komt ook voor in zoet water en kustwater. Ook in rivieren of geïsoleerde wateren, meestal met een modderig substraat.

Problematiek

Predatie van viseieren en competitie met andere vissen voor voedsel.



Kenmerken

- Grootte: Zeer variabel, 12-49,5 cm; gewicht: 250-2200 g
- Lichaam lateraal afgeplat met breedste punt bij de inplanting van de dorsale vin
- Kleur
 - » Rug: donker grijsgroen, donker zilvergroen of zelfs donkerbruin tot bijna zwart
 - » Zijden: bleek olijf- of zilvergroen
 - » Buik: zilverwit
 - » Juvenielen soms met zwakke laterale strepen
- Vinnen:
 - » Twee dorsale vinnen die verbonden zijn door een membraan; eerste rugvin met 6-10 stekels **1**, laatste met 10-13 vinstralen **2**; wanneer de rugdorsale vin wordt gemanipuleerd beweegt de tweede rugvin mee naar boven
 - » Anale vin met 1 stekel en 8-10 vinstralen
 - » Geen vetvin
- Laterale lijn met 44-52 ctenoïde schubben

Gelijkende soorten

In de handel en in het wild in sommige Europese rivieren kan de soort verward worden met de hybride gestreepte baars *M. chrysops* x *M. saxatilis*

Voor meer informatie

ALGEMEEN

→ <https://www.cabi.org/isc/datasheet/74160>

REGIONALE PORTALEN

→ Vlaanderen: <https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-dieren>

→ Wallonië: <http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives>

IMPLEMENTATIE EU-VERORDENING

→ <http://www.iasregulation.be/nl>

Restricties

Met uitzondering van de specifieke gevallen die in de Europese Verordening worden voorzien, is het in alle Europese lidstaten verboden om deze soort te importeren, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, te houden, te kweken, uit te wisselen of in de natuur vrij te laten.