

# Écrevisses

Cinq espèces d'écrevisses exotiques sont actuellement reprises sur la liste des espèces préoccupantes pour l'Union Européenne. Elles sont présentées ici de manière regroupée en raison des similarités de leurs nuisances et leurs voies d'introduction.

**Voies d'introduction** | Échappées de captivité (aquarium, aquaculture), accidentellemnt présentes dans des lots de réempoissonnement. Dispersion naturelle depuis les pays voisins.

**Nuisances** | Les écrevisses nord-américaines sont porteuses saines de la peste de l'écrevisse, une maladie fatale à l'écrevisse indigène *Astacus astacus*. Du fait de leur régime alimentaire omnivore et de leur capacité à modifier les caractéristiques de l'habitat, elles peuvent induire des déséquilibres dans les écosystèmes aquatiques. Certaines provoquent également des impacts économiques significatifs (consommation des alevins, destruction des berges, etc.).

**Espèces ressemblantes** | De nombreuses espèces d'écrevisses sont commercialisées et peuvent être confondues avec celles reprises sur la liste européenne, spécialement au stade juvénile, telles que *Cambarellus spp.*, *Cherax spp.*, et d'autres *Procambarus spp* qui ne sont pas listées. Dans l'environnement, ces espèces peuvent être confondues avec l'écrevisse indigène *Astacus astacus*.

## RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=36648>

! Ces espèces peuvent être aussi facilement confondues avec d'autres écrevisses exotiques. Il est recommandé de contacter un expert pour valider leur identification.



# Écrevisse de Louisiane

*Procambarus clarkii*

RODE AMERIKAANSE RIVIERKREEFT | RED SWAMP CRAYFISH

Synonyme: Écrevisse rouge des marais

**Distribution en Belgique** | Au sud du sillon Sambre et Meuse, espèce présente en faible densité dans des étangs isolés. Au nord du sillon Sambre et Meuse, espèce assez répandue, principalement dans les canaux.

## CARACTÉRISTIQUES

- Taille: environ 10-12 cm (max 15 cm)
- Coloration naturelle sombre-rougâtre mais certaines variétés ornementales affichent une coloration différente (blanc, orange ou bleu); les plus jeunes individus sont généralement gris-verdâtre
- Pincés effilées, rouges avec de nombreuses protubérances ①
- Présence de plusieurs pointes colorées sur l'article précédant la pince ②